

Об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами, с 16.06.2023 по 22.06.2023

Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу проводится еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами.

С 16.06.2023 по 22.06.2023 в медицинские организации Санкт-Петербурга по поводу присасывания клещей обратились 786 человек, в том числе 127 детей до 17 лет.

Всего в черте города укусы были нанесены в 102 случаях (Пушкинский - 25, Курортный - 23, Приморский - 14, Выборгский - 8, Московский и Красногвардейский по 6, Красносельский - 4, Петродворцовый, Кировский, Невский, Фрунзенский по 3, Калининский - 2, Колпинский и Кронштадтский по 1).

За неделю зарегистрирован 1 случай заболевания клещевым энцефалитом и 6 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

С 16.06.2023 по 22.06.2023 на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) исследовано 758 клещей, положительных - 3; на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано - 757 клещей, положительных - 195; на моноцитарный эрлихиоз человека - 673, положительных - 25; на гранулоцитарный анаплазмоз человека - 673, положительных - 2.

В рамках плановой вакцинации в Санкт-Петербурге с 16.06.2023 по 22.06.2023 привито против клещевого энцефалита 710 человек, в том числе 355 детей.

Что делать, если присосался клещ?

При присасывании клеща необходимо срочно обратиться в ближайший травматологический пункт <http://zdrav.spb.ru/ru/news/1844/>, где клеща снимут и отправят на исследование, а место укуса осмотрят и обработают.

Вы можете снять клеща самостоятельно. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

-захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

-место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

-после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,

-если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым с укусами клещей, находится под контролем Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

